

### 4.3 Calendrier de rattrapage 2018 des vaccinations de base recommandées pour les enfants à partir d'un an, les adolescents et les adultes jamais vaccinés

| Âge des personnes jamais vaccinées<br>Vaccins contre :             | Personnes concernées         | Schémas de vaccination                                   | Rappel suivant  | Nombre total de doses |
|--|------------------------------|--|---|-----------------------|
| <b>1 - 5 ans</b>   |                              |  |   |                       |
| Diphtérie (D), Tétanos (T), Polio (P), Coqueluche acellulaire (Ca) | Tous                         | 0, 2 mois, 8-12 mois                                     | 6-7 ans ( <b>ou ≥ 2 ans après le premier rappel</b> )   | 4                     |
| <i>Haemophilus influenzae b</i> (Hib)                              | Tous                         |  |   | 1                     |
| Hépatite B   | Tous                         | 0, 1 ou 2 mois, 6 mois                                   |   | 3                     |
| Méningocoque C (vaccin conjugué)                                   | Tous                         |  |   | 1                     |
| Pneumocoque (vaccin conjugué)                                      | Enfants âgés de 12 à 23 mois | 0, 2 mois (intervalle d'au moins 2 mois entre les doses) |   | 2                     |
| Rougeole (R), Oreillons (O), Rubéole (R)                           | Tous                         | 0, 1 mois  |   | 2                     |
| <b>6 - 10 ans</b>  |                              |  |   |                       |
| Diphtérie (D), Tétanos (T), Polio (P), Coqueluche acellulaire (Ca) | Tous                         | 0, 2 mois, 8-12 mois                                     | 11-13 ans ( <b>ou ≥ 2 ans après le premier rappel</b> ) | 4                     |
| Hépatite B   | Tous                         | 0, 1 ou 2 mois, 6 mois                                   |   | 3                     |
| Méningocoque C (vaccin conjugué)                                   | Tous                         |  |   | 1                     |
| Rougeole (R), Oreillons (O), Rubéole (R)                           | Tous                         | 0, 1 mois  |   | 2                     |

| Age des personnes jamais vaccinées<br>Vaccins contre :  | Personnes concernées                      | Schémas de vaccination   | Rappel suivant                                      | Nombre total de doses |
|---|---|--|---|-----------------------|
| <b>11 - 15 ans</b>  |   |  |   |                       |
| Diphtérie (D), Tétanos (T), Poliomyélite Coqueluche acellulaire (Ca)                                    | Tous                                      | 0, 2 mois, 8-12 mois   | À 25 ans : dTcaP                                    | 4                     |
| Hépatite B  | Tous                                      | 0, 1 ou 2 mois, 6 mois<br>0, 6 mois <sup>1</sup>                     |   | 2 ou 3                |
| Méningocoque C (vaccin conjugué)  | Tous                                      |  |   | 1                     |
| Papillomavirus (HPV)  | Toute jeune fille de 11 à 14 ans révolus  | 0, 6 mois / 0, 1, 6 mois / 0, 2, 6 mois, selon âge et vaccin utilisé |   | 2 ou 3                |
| Rougeole (R), Oreillons (O), Rubéole (R)  | Tous                                      | 0, 1 mois  |   | 2                     |
| <b>≥ 16 ans</b>   |   |  |   |                       |
| Diphtérie (d), Tétanos (T), Poliomyélite (P) <sup>2</sup><br>1 <sup>ère</sup> dose avec ca <sup>3</sup> | Tous                                      | 0, 2 mois, 8-12 mois   | À 25 ans : dTcaP<br>ou dTP si dernier ca<br>< 5 ans | 4                     |
| Méningocoque C (vaccin conjugué)  | Tous jusqu'à l'âge de 24 ans révolus      |  |   | 1                     |
| Papillomavirus (HPV)  | Jeunes femmes de 15 à 19 ans révolus      | 0, 1 ou 2 mois, 6 mois<br>selon âge et vaccin utilisé                |   | 3                     |
| Rougeole (R), Oreillons (O), Rubéole (R)  | Tous nés depuis 1980                      | 0, 1 mois  |   | 2                     |
| Rougeole (R), Oreillons (O), Rubéole (R) <sup>4</sup>   | Femmes nées avant 1980 en âge de procréer |  |   | 1                     |

[1] Utiliser Engerix® B20 en respectant un intervalle de 6 mois et en l'absence de risque élevé d'infection par le virus de l'hépatite B dans les 6 mois qui séparent les 2 injections.

[2] dTP : vaccin combiné diphtérie, tétanos, poliomyélite avec une dose réduite d'anatoxine diphtérique (d).

[3] dTcaP : vaccin combiné diphtérie, tétanos, poliomyélite et coqueluche avec des doses réduites d'anatoxine diphtérique (d) et d'antigènes coquelucheux (ca).

[4] Dans le cadre du rattrapage de la vaccination contre la rubéole pour les femmes en âge de procréer.