

## 4.4 Tableau des calendriers vaccinaux recommandés – 2022 en Guyane et à Mayotte, chez les enfants en population générale Hors Covid-19

Âges	Calendrier vaccinal en Guyane	Calendrier vaccinal à Mayotte
Naissance	BCG, HepB <sup>(1)</sup>	BCG, HepB <sup>(1)</sup>
2 mois	DTCaP Hib <sup>(1)</sup> , HepB <sup>(2)</sup> PnC <sup>(1)</sup>	DTCaP Hib <sup>(1)</sup> , HepB <sup>(2)</sup> PnC <sup>(1)</sup>
3 mois	Méningocoque B <sup>(1)</sup>	Méningocoque B <sup>(1)</sup>
4 mois	DTCaP Hib <sup>(2)</sup> PnC <sup>(2)</sup>	DTCaP Hib <sup>(2)</sup> PnC <sup>(2)</sup>
5 mois	Méningocoque C, Méningocoque B <sup>(2)</sup>	Méningocoque C, Méningocoque B <sup>(2)</sup>
11 mois	DTCaP Hib (rappel), HepB (rappel) PnC (rappel)	DTCaP Hib (rappel), HepB (rappel) PnC (rappel)
12 mois	FJ <sup>(1)*</sup> , ROR <sup>(1)</sup> , Méningocoque B (rappel)	ROR <sup>(1)</sup> , Méningocoque C (rappel), Méningocoque B (rappel)
16-18 mois	ROR <sup>(2)</sup> , Méningocoque C (rappel), FJ <sup>(1)*</sup> si non réalisé avant	ROR <sup>(2)</sup>
24 mois	FJ si non réalisé avant	
6 à 10 ans	FJ <sup>(2)</sup> si vaccination réalisée avant 2 ans	

(1) : 1<sup>ère</sup> dose

(2) : 2<sup>e</sup> dose

- **DTCaP** : vaccin contre diphtérie, tétanos, coqueluche acellulaire et poliomyélite
- **Hib** : vaccin contre *Haemophilus influenzae* de type b
- **HepB** : vaccin contre l'hépatite B
- **PnC** : vaccin 13-valent contre le pneumocoque
- **FJ** : vaccin contre la fièvre jaune
- **ROR** : vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole

\* Les enfants vaccinés entre 9 mois et avant l'âge de 2 ans bénéficieront d'une seconde dose entre 6 ans et dans un délai maximal de 10 ans.