



MSD Vaccins  
S.A.S. au capital de 3.394.526,25 €  
162, avenue Jean Jaurès  
CS 50712  
69367 Lyon cedex 07  
Tél. : 04 37 28 40 00

21 février 2020

**Lettre à l'attention des professionnels de santé**

**Arrêt définitif de commercialisation du vaccin quadrivalent GARDASIL® Vaccin Papillomavirus Humain [Types 6, 11, 16, 18] (Recombinant, adsorbé) suspension injectable en seringue préremplie au 31 décembre 2020**

Chère Consœur, Cher Confrère,

MSD Vaccins vous informe qu'à compter du 31 décembre 2020 le vaccin quadrivalent **GARDASIL®** Vaccin Papillomavirus Humain [Types 6, 11, 16, 18] (Recombinant, adsorbé) suspension injectable en seringue préremplie **ne sera plus commercialisé**.

Nous vous rappelons que le vaccin **GARDASIL® 9** Vaccin Papillomavirus Humain 9-valent (Recombinant, adsorbé) suspension injectable en seringue préremplie est **toujours disponible**.

Dans son [avis relatif à la place du vaccin Gardasil 9® dans la stratégie actuelle de prévention des infections à papillomavirus humains](#) du 10 février 2017, le Haut Conseil de la Santé Publique recommande le GARDASIL® 9 pour toute nouvelle initiation de vaccination contre les infections à papillomavirus, le vaccin quadrivalent étant uniquement recommandé pour poursuivre les schémas déjà initiés.\*\*

**Le vaccin quadrivalent GARDASIL® est donc laissé à disposition des professionnels de santé jusqu'au 31 décembre 2020 de façon à permettre la poursuite et la fin des schémas vaccinaux initiés avec ce vaccin.**

Pour mémoire le schéma vaccinal recommandé<sup>1</sup> pour GARDASIL® est le suivant :

- Vaccination initiée entre 11 et 13 ans révolus : deux doses espacées de 6 mois
- Vaccination initiée entre 14 et 19 ans révolus : trois doses administrées selon un schéma 0, 2 et 6 mois
- Pour les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes jusqu'à 26 ans révolus : trois doses administrées selon un schéma 0, 2 et 6 mois

Pour des informations complètes sur ces vaccins, veuillez consulter le RCP disponible sur le site <http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/> et le Calendrier des vaccinations 2019 [https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/calendrier\\_vaccinal\\_mars\\_2019.pdf](https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/calendrier_vaccinal_mars_2019.pdf).

Le service d'information médicale de MSD Vaccins est à votre disposition pour toute information complémentaire au 01 80 46 40 40 ou par courriel à [information.medicale@msd.com](mailto:information.medicale@msd.com).

Nous vous prions de croire, Chère Consœur, Cher Confrère, en l'assurance de nos salutations distinguées.

**Cécile Charroin**  
Pharmacien Responsable

**Jean Cimbidi**  
Directeur Médical

<sup>1</sup> Calendrier vaccinal 2019 [https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/calendrier\\_vaccinal\\_mars\\_2019.pdf](https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/calendrier_vaccinal_mars_2019.pdf)

**\*\*[Avis relatif à la place du vaccin Gardasil 9® dans la stratégie actuelle de prévention des infections à papillomavirus humains](#)** du 10 février 2017

« Chez les jeunes filles et les jeunes femmes non vaccinées antérieurement, le HCSP recommande d'initier la vaccination par GARDASIL 9® selon le schéma suivant (niveau de preuve 1, tableau 5) :

- A deux doses chez celles âgées de 11 ans à 14 ans révolus.
- A trois doses chez celles âgées de 15 ans à 19 ans révolus.
- Chez celles ayant déjà initié un schéma vaccinal par GARDASIL® ou CERVARIX® (1 dose ou 2 doses), la vaccination doit être poursuivie avec le même vaccin.
- Chez celles ayant préalablement reçu un schéma complet (deux doses ou trois doses) avec GARDASIL® ou CERVARIX®, le HCSP ne recommande pas de vaccination avec GARDASIL 9®.

Chez les Hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, le HCSP recommande que la vaccination soit initiée avec GARDASIL 9® jusqu'à l'âge de 26 ans selon un schéma à trois doses (niveau de preuve 2, tableau 5, données d'immunogénicité).

- Chez ceux ayant déjà initié un schéma vaccinal par GARDASIL®, la vaccination doit être poursuivie avec ce même vaccin.
- Chez ceux ayant reçu un schéma complet à 3 doses avec GARDASIL®, le HCSP ne recommande pas de vaccination avec GARDASIL 9®.

Chez les personnes immunodéprimées non vaccinées antérieurement, le HCSP recommande que la vaccination contre les infections à papillomavirus humains puisse être initiée :

- Chez les jeunes filles par GARDASIL 9® (avis d'expert)
- Chez les garçons par GARDASIL 9® (avis d'expert).
- Chez celles ayant initié un schéma vaccinal avec GARDASIL® ou CERVARIX®, la vaccination doit être poursuivie avec le même vaccin.
- Chez celles ayant reçu un schéma complet avec GARDASIL® ou CERVARIX®, le HCSP ne recommande pas de vaccination avec GARDASIL 9®.

Le HCSP recommande de veiller à la disponibilité du nombre de doses nécessaires à la poursuite des schémas vaccinaux initiés avec GARDASIL®, CERVARIX®, et GARDASIL 9®. »